



Pozdravljeni!

Kmetovalci so povečini posadili krompir, za katerega je značilno, da zaradi slabše tekmovalne sposobnosti težko konkurira plevelom. Zlasti pozne sorte krompirja so že v poletnih mesecih velikokrat močno zapleveljene. Plevel krompirju odvzema hranila in poveča verjetnost za razvoj bolezni. Bayer s Sencorjem in Plateenom omogoča popolno kontrolo nad pleveli in hkrati bistveno pripomore k višjemu pridelku.

Sencor

Pripravek se uporablja pred in po vzniku krompirja in vse do takrat, ko rastlina krompirja zraste do višine 10 cm, zaradi česar lahko že v prihodnjih dneh in tednih pričakujemo povečano povpraševanje po omenjenem pripravku.

Pred in po vzniku krompirja je treba odmerek prilagoditi zemljišču (glej navodila).

Odsvetujemo uporabo Sencorja po vzniku na lahkih tleh in pri temperaturah nad 25 °C. Naj opozorimo, da Sencor pri sortah Jaerla, SV 77/48, SV 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Voran, Minerva in Red Fantasy povzroča poškodbe na krompirju (fitotoksičnost), medtem ko je škropljenje pred vznikom krompirja pri omenjenih sortah možno.

Sredstvo se uporablja tudi za zatiranje plevela v posevkih lucerne in paradižnika.

Plateen

Škropimo po sajenju in pred vznikom krompirja. Pripravek ne povzroča nikakršnih poškodb na gojeni rastlini, če je tretiranje izvedeno v skladu s priporočili. Za dobro delovanje potrebuje vlago. V sušnih razmerah grebene osujemo ponoči in nato škropimo, s čimer izkoristimo vlago v zemlji!

Grodyl

Je najboljši pripravek za zatiranje ščavja in drugih širokolistnih plevelov (regrat, rman ...). Grodyla uporabimo 60 g/ha, po prvem ali tretjem odkosu, ko se ščavje dodobra olista in je v intenzivni rasti ter visoko do 15 cm. Možno je tretiranje po celotni površini travnišč ali ciljno škropljenje z nahrbtno škropilnico (2 g Grodyla /10 L vode + močilo + nekaj pesti Uree). Je varen za plazečo deteljo in ima kratko karenco. Za boljše delovanje

Ljubljana, 6. 4. 2011

Bayer d. o. o.
Bayer CropScience
Bravničarjeva 13
SI - 1001 Ljubljana, p. p. 2354

Tel. 01 581 44 44

Faks 01 581 44 57
info@bayercropscience.si
www.bayercropscience.si

Registrsko sodišče:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. registrskega vložka:
1/474/00
Osnovni kapital:
4.633.858,00 EUR



Stran 2 od 2

priporočamo dodajanje močila in 5 kg/ha Uree v škropilno brozgo. Kmetovalci zaradi dolge dobe do pojava znakov propadanja plevelov večkrat menijo, da pripravek ne deluje. Kot prvi znak delovanja naj upoštevajo prenehanje rasti plevelov in ne obarvanost listov v vijolične nianse, ki nastopi šele čez 1-2 tedna.

Lep pozdrav do prihodnjíč!

Vaš Bayer

obvestila