



**120** *let*  
**SEMENARNA**  
*Ljubljana*

# SEMENSKI KROMPIR

2026

| Kdor krompir saditi zna, srečo ima |



[www.semenarna.si](http://www.semenarna.si)

Slovenci smo krompirjev narod,  
kar poleg vsesplošne uporabe v kulinariki, potrjuje  
tudi star slovenski pregovor:

**“BREZ KROMPIRJA NI KOSILA.”**



Dandanes zaseda krompir pomembno mesto v prehrani ljudi. Sadijo ga tako večji kot tudi manjši pridelovalci na njivah, vrtovih in v zadnjem času celo v loncih na svojih balkonih. Krompir vedno znova očara pridelovalce s svojimi podzemnimi kot tudi nadzemnimi deli. Slednji nam v času cvetenja pričarajo prelepo barvno kuliso.



#### **Optimalni pogoji za skladiščenje semenskega krompirja:**

Semenski krompir je potrebno vse do kalitve skladiščiti v temnem, zračnem prostoru in pri primerni konstantni temperaturi ter visoki zračni vlažnosti. S tem preprečimo pojav skladiščnih bolezni, uvelost in kalitev.

Semenski krompir se shranjuje pri najnižji temperaturi 3-4 °C in pri 50 - 80 % relativni zračni vlažnosti.

Razdelitev sort po zgodnosti	Število dni od sajenja do izkopa
Zelo zgodnje sorte	60-80 dni
Zgodnje sorte	80-100 dni
Srednje zgodnje sorte	100-110 dni
Srednje pozne do pozne sorte	110-140 dni




Legenda za tip kuhanja:

- Tip A - gomolji se ne razkuhajo, za solate in pečenje
- Tip AB - precej trdni gomolji po kuhanju, za solate, pečenje in praženje
- Tip B - srednje trdni gomolji po kuhanju, za praženje in pire
- Tip BC - po kuhanju gomolji lahko deloma razpadejo, za praženje, pire, krompirjevo testo in cvrtje

## TEHNOLOŠKA PREGLEDNICA SORT SEMENKEGA KROMPIRJA V NAŠI PONUDBI

Sorte	Barva kože	Barva mesa	Oblika gomoljev	Tip kuhanja	Skladiščenje	str.
<b>ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE</b>						
LAPERLA <b>NOVO</b>	svetlo rumena	svetlo rumena	okroglo ovalna	AB	zelo dobro	6
PRADA	svetlo rumena	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	6
CELTIANE	rumena	svetlo rumena	podolgovata	A	dobro	7
DAIFLA	svetlo rumena	bela	okroglo ovalna	B do BC	zelo dobro	7
<b>ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE</b>						
QUEEN ANNE	rumena	rumena	ovalna	B	dobro	11
MESSI	svetla	bela	okroglo ovalna	B	dobro	11
<b>SREDNJE ZGODNJE SORTE</b>						
BELMONDA	rumena	rumena	okroglo ovalna	B	zelo dobro	13
<b>SREDNJE POZNE DO POZNE SORTE</b>						
LABELLA <b>NOVO</b>	rdeča	rumena	ovalna	B	dobro	14
7 FOUR 7	svetlo rumena	bela	ovalna	AB	dobro	15
PETER PAN <b>NOVO</b>	svetlo rumena	rumena	ovalna	A	zelo dobro	15



# OGORČICE? MI IMAMO REŠITEV!

**NOVO**

## NOV FUNGICID OBVLADUJE ŠIROK SPEKTER OGORČIC.

Ne zatira samo ogorčic pod zemljo, ampak tudi zaščiti korenine, zatira ključne bolezni in povečuje potencialni donos.

**\*S sredstvom se tretira pred sajenjem, neposredno v brazdo.**

**PAKIRANJE IN PRIPOROČILO  
ZA UPORABO:  
250 G ZA 0,4 HA**

brez uporabe  
VELUM PRIME



z uporabo  
VELUM PRIME



# "NAJMOČNEJŠI SO TU!"

IZBRANE SORTE SEMENSKEGA KROMPIRJA ZA USPEH

" Plesen na listih...ne hvala! " .....

Odporna sorta na Phytophthoro (plesen na listih)



## PETER PAN

Pozna sorta

**NOVO**



" V boju s sušo sva zmagovalca! " .....

Odporni sorti na bolezni, ki odlično uspevata tudi v sušnih pogojih.

## BELMONDA

Srednje zgodnja sorta



## LAPERLA

Zelo zgodnja sorta

**NOVO**



" Novi, odpornejši in slastnejši " .....

Nove, izboljšane sorte starih sort.

## LABELLA

Srednje zgodnja do srednje pozna sorta

**NOVO**



# ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE

Med zelo zgodnjimi sortami izstopa sorta **PRADA**, ki zelo hitro polni gomolje.

Med kifeljčarji je poznana okusna sorta **CELTIANE**.

Novejša belomesnata sorta je sorta **DAIFLA**, ki jo lahko pridelujemo tudi za srednje zgodnji krompir, saj rastlina ostane dolgo zelena.

Sorta **LA PERLA** dobro prenaša sušo ter je primerna za proizvodnjo mladega krompirja.



# LAPERLA **NOVO**

## Zelo zgodnja sorta

- Primerna za vse tipe tal
- Odlično prenaša sušo
- Primerna za zgodnje pobiranje in proizvodnjo mladega krompirja
- Zaradi zgodnosti se daljše skladiščenje ne priporoča

### Pridelovalne posebnosti:

- Sajenje na srednjo globino



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Zelo visoka	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalna	Vsebnost suhe snovi	-	Odpornost na krastavost	Visoka
Dormanca	Srednja			Skladiščenje	Srednje		

# PRADA

## Zelo zgodnja sorta z visokim pridelkom

- Hitro polnjenje gomoljev
- Odporna na nematode Ro1/4
- Primerna za svežo porabo in krajše skladiščenje
- Primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja
- Zelo odporna na Y virus



SADILNA NORMA		
Debelina gomoljev v mm	kg/ha	Razdalja v vrsti
28/35 mm	1.400 kg/ha	23-25 cm
35/55 mm	3.400 kg/ha	28-30 cm

### Pridelovalne posebnosti:

- Sadimo v stadiju kratkih kaličev
- Zgodnje gnojenje z manganom in magnezijem pozitivno vpliva na kvaliteto pridelka
- Za gnojenje s kalijem se priporoča fosfatna oblika kalija
- Zaradi občutljivosti na Fusarium je priporočljivo prezračevanje in sušenje pridelka pred skladiščenjem

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	10	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	18,1	Odpornost na krastavost	Dobra
				Skladiščenje	Srednje		

# CELTIANE

## Krompir v tipu kifeljčar

- Podolgovati gomolji z lepim izgledom in široko uporabnostjo
- Nagrada za okus leta v Franciji v letu 2015
- Izredna kakovost jedilnega krompirja



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
32/40 mm	3.500 kg/ha

### Pridelovalne posebnosti:

- Sorta CELTIANE ima dolgo dobo mirovanja, zato se priporoča nakaljevanje in sajenje v dovolj ogreta tla
- Zadostno gnojenje s kalijem omogoči dobro rast gomoljev, kalcij učvrsti kožo gomoljev

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Srednja do visoka	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Barva mesa	Svetlo rumena do krem	Kuharski tip	A	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Podolgovata - kifeljčar	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Srednja do dobra
				Skladiščenje	Dolgo		

# DAIFLA

## Močna rastlina in belo meso

- Prilagodljiva in široko uporabna sorta z debelimi gomolji
- Rastlina ostane dolgo zelena in je robustna
- Visoka odpornost na sušo, udarce, drugotno rast in pojav votlega srca



### Pridelovalne posebnosti:

- Priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika
- Pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju, da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Krem	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	18-20%	Odpornost na krastavost	Srednja
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		



# Krompir v domačem vrtu

## Čas sajenja krompirja

Odvisen je od vrste tal, podnebnih značilnosti in vremenskih razmer. Tla se morajo ogreti na 5 - 7 °C, kar ponekod zavleče sajenje vse do konca aprila. Za takšne predele, ki imajo tudi krajšo rastno sezono, se obnese nakaljevanje krompirja šest tednov pred sajenjem. Gomolje položimo v plitve zabojčke z očesi navzgor, v svetel in zračen prostor s temperaturo med 12 - 15 °C.

*Da si olajšamo delo, lahko krompir v zabojčkih, pripravljen za nakaljevanje, že kupimo.*

Za gojitev v zelenjavnem vrtu so najprimernejše rane sorte krompirja, ki so na razpolago tudi v manjših, "vrtačarskih" pakiranjih. Poleg tega, da nam dajo rane sorte pridelok takrat, ko je prvi krompir v trgovinah še razmeroma drag, se z zgodnejšim izkopom izognemo tudi okužbi s krompirjevo plesnijo.

Nakaljeni krompir najlažje sadimo, ko so brsti veliki 2 cm, lahko pa so tudi večji. Pazimo le, da jih pri sajenju ne poškodujemo. Sadilna razdalja je različna. Zgodnje sorte sadimo nekoliko globlje,

da so boljše zaščitene pred mrazom, obenem pa potrebujejo manjšo razdaljo kot pozne sorte. Optimalna medvrstna razdalja je od 70 - 75 cm, razdalja v vrsti pa od 30 - 35 cm in za drobne gomolje 25 cm.

Spomladanski mraz lahko popolnoma uniči krompir, zato ga po sajenju za nekaj časa pokrijemo z vrtno tkanino.

**V kolobarju** sadimo krompir na gredico, kjer je lani rasla repa, cvetača, ohrovt ali brokoli, naslednje leto pa bomo na tej gredici pridelovali čebulo, česen, šalotko ali por.


**V mešanem** posevku s krompirjem se dobro obnese hren, ki ga varuje pred koloradskim hroščem, skupaj s kumino in poprovo meto pa bo gomoljem tudi izboljševal okus.

**Dobri sosedje** krompirju so špinača, hren, pastinak, jagode, fižol in čebula, slabše pa bo rasel v družbi s paradižnikom, zeleno in bučkami.

Domovina krompirja je Južna Amerika, kjer so ga Inki gojili že pred več kot 2000 leti, v Evropo pa so ga prinesli Španci z enega izmed svojih osvajalskih pohodov. Zanimivo je, da Evropejci v začetku niso poznali prave vrednosti krompirja in so ga gojili kot okrasno rastlino. Njegovo cvetje je krasilo celo damske klobuke.

Krompir je za vzgojo precej enostaven, saj potrebuje le dovolj prostora in primerna tla. Najboljša so lahka do srednje težka tla, težja pa lahko izboljšujemo že ob koncu poletja.

Takrat na površino posejemo rastline za zeleno gnojenje, ki jih kasneje uniči prva slana, njihove ostanke pa zakopljemo v tla. Rastline za zeleno gnojenje tla zrahljajo ter obogatijo z dušikom in organsko maso. Če gredice, na katero bomo sadili krompir, nismo zeleno pognojili, jeseni gnojimo z organskimi ali mineralnimi gnojili, ki jih zakopljemo v tla.



# ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE

Med zgodnjimi do srednje zgodnjimi sortami je bila poznana sorta **NATASCHA**, ki jo zamenjuje sorta **QUEEN ANNE** z zelo lepimi gomolji in zelo dobrim skladiščenjem, kljub zgodnosti. V to skupino sort spada tudi novejša belomesnata sorta **MESSI** s široko uporabnostjo, ki zamenjuje sorto **DIVA**.



# QUEEN ANNE

## Kraljevsko lepi gomolji

- Gomolji z zelo gladko in lepo kožo
- Visok pridelek izenačenih gomoljev
- Kljub zgodnosti se zelo dobro skladišči



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.500 kg/ha

### Pridelovalne posebnosti:

- Sorta QUEEN ANNE ima visok nastavek gomoljev na rastlino, zato se priporoča večja medvrstna razdalja pri sajenju
- Zaradi visokega nastavka gomoljev ji bolj ustrezajo srednje težka tla

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja do visoka
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Visoko	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Visoka
Dormanca	Visoka			Skladiščenje	Zelo dobro		

# MESSI

## Kakovostna bela sorta

- Lepi gomolji s svetlo kožo in belim mesom
- Primerna tudi za pridelovanje na lažjih tleh in v sušnih pogojih
- Sorta primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.500 kg/ha

### Pridelovalne posebnosti:

- Zaradi globokih korenin in dobrega izkoriščanja hranil se priporoča manj gnojenja z dušikom

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Svetla	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Dormanca	Srednja	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalno okrogli	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na krastavost	Dobra

# SREDNJE ZGODNJE SORTE

Pridelovalci z izbiro odpornih sort zmanjšajo stroške za zaščito rastlin pred krompirjevo plesnijo. Uveljavljena sorta **BELMONDA** z rumenim mesom je sinonim za kakovost, robustnost, odpornost na sušo, visok pridelek in zelo dobro skladiščenje.



- Zelo prilagodljiva sorta z visokim pridelkom
- Okroglo ovalni gomolji za široko kuharsko uporabo
- Sorta se vse bolj širi v segmentu zanesljivih sort za pridelovanje krompirja




SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.300 kg/ha

### Pridelovalne posebnosti:

- Sorta BELMONDA je robustna sorta, primerna za pridelovanje v vseh pridelovalnih območjih

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Visoka
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Rumena	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev/rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalni	Kuharski tip	B	Odpornost na navadno krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		



# SREDNJE POZNE DO POZNE SORTE




## LABELLA **NOVO**

### Alternativa sorti Masai

- Nova sorta, ki daje velike pridelke
- Veliko število gomoljev z lepo rdečo kožico in močnim rumenim mesom.
- Odličnega okusa

### Pridelovalne posebnosti:

- Za vse tipe tal



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja/ srednje pozna sorta	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Dobra
Dormanca	Odlična	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Dobra
Število gomoljev na rastlino	Veliko	Oblika gomoljev	Ovalna	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na krstavost	Dobra

# 7 FOUR 7

## Perspektivna in okusna belomesnata sorta

- Široko uporabna belomesnata sorta
- Odlikuje jo dobra odpornost na poglavitne bolezni in fiziološke motnje krompirja



### Pridelovalne posebnosti:

- Primerna za pridelovanje na vseh tipih tal

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja do srednje pozna	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Bela do krem	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Visoka
Dormanca	Srednja do dolga			Skladiščenje	Dobro		

# PETER PAN **NOVO**



## Odporna sorta na plesen na listih.

### Številka 1 na Nizozemskem.

- Pozna sorta z odličnim okusom
- Odporna na Phytophthora (plesen na listih) in plesen na gomoljih.
- Trenutno ena izmed najodpornějšíh sort na tržišču

### Pridelovalne posebnosti:

- Visoko število nastavkov in gomoljev na rastlino



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	pozna	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Zelo odporna
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Dobra
Število gomoljev na rastlino	Visoko	Oblika gomoljev	Okroglo ovalna	Vsebnost suhe snovi	-	Odpornost na krastavost	Srednja
Dormanca	Srednja			Skladiščenje	Dobro		



# ZA UČINKOVITO ZAŠČITO KROMPIRJEVE PLESNI

**FUNGICIDI ZA NAJVEČJI  
PRITISK GLIVIČNE  
BOLEZNI FITOFTORE  
TEKOM VEGETACIJE.**











**Copforce  
Extra**

**Rival  
Duo**

Sredstva so na voljo ob predložitvi izkaznice o opravljenem usposabljanju iz znanja fitomedicine.  
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.  
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

[www.semenarna.si](http://www.semenarna.si)



FAZA	DO ZAPIRANJA VRSTIC	CVETENJE	OBLIKOVANJE PLODOV
	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT FOLLY START + FITOFERT BIOFLEX-L</p> <p>0.3 + 0.4</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L</p> <p>0.3 + 0.4</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>MAGNICAL-B</p> <p>0.5</p>
			
NPK + Mg+ME 	<p>kg/ha po fenofazi</p> <p>FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT BIOFLEX-L</p> <p>50 + 5</p>	<p>kg/ha po fenofazi</p> <p>FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME</p> <p>80</p>	<p>kg/ha po fenofazi</p> <p>FITOFERT KRISTAL FINALE 5-10-45+ME</p> <p>150</p>
Ca	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT   25	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT   50	
			

## KROMPIR

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo z visoko vsebnostjo kalija in normalno vsebnostjo dušika.



FOLIARNO



NAMAKANJE

# VARSTVO KROMPIRJA

Imamo rešitve za vse izzive –  
z našimi nasveti do obilnega pridelka!



## DA BO KROMPIR NA NJIVI BREZ PLEVELA:



Da plevel ne bo predstavljal izziva, je tu Challenge 600. Kontaktni herbicid, ki se uporablja po setvi in pred vznikom krompirja za zatiranje **širokolistnega in ozkolistnega plevela**.

\*Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh.

PAKIRANJE: 100 mL, 1 L

PRIPOROČILO ZA UPORABO: 100 mL za 2,5 ar;  
1 L za 25 ar; 4 L/ha



## ZAŠČITA PRED PLEVELI ŠE PRED VZNIKOM KROMPIRJA

Talni herbicid, ki vsebuje aktivno snov pendimetalin in je namenjen zatiranju **enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela**.

Vsebuje mikrokapsule, ki postopoma sproščajo aktivno snov, kar zagotavlja **dolgotrajnejše in učinkovitejše delovanje**. Uporaba dovoljena na VVO.

\*Tretira se po setvi pred vznikom krompirja. Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna.

PAKIRANJE: 1 L, 5L

PRIPOROČILO ZA UPORABO: 2,9 L/ha

**Stomp®**  
**Aqua**

## ZANESLJIVA REŠITEV ZA ŠIROKOLISTNE PLEVELE

Selektivni, kontaktni herbicid, namenjen zatiranju enoletnih in nekaterih večletnih **širokolistnih plevelov**. Aktivna snov bentazon deluje herbicidno izključno preko zelenih delov plevela.

\*Tretira se po vzniku, ko je krompir visok največ 10 cm (BBCH 12-19) in temperatura zraka ne presega 25 °C.

PAKIRANJE: 1 L

PRIPOROČILO ZA UPORABO: 1,5 – 2 L/ha

**Basagran®**  
**480**

## USTAVI OZKOLISTNE PLEVELE PO VZNIKU

**Focus®**  
**Ultra**

Sistemični foliarni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega **ozkolistnega plevela**. Uporaba dovoljena na VVO.

\*Tretira se po vzniku krompirja (v razvojni fazi od razvitih dveh do devet pravih listov), v fazi, ko ima plevel 3-5 listov. Priporočljivo je, da so rastline v času škropljenja suhe. Mešanje s sredstvom Basagran® 480 se odsvetuje v primeru uporabe v krompirju.

PAKIRANJE: 5 L

PRIPOROČILO ZA UPORABO:

- 2 L/ha (za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit),
- 4 L/ha (za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela)

## NOV FUNGICID S SISTEMIČNIM DELOVANJEM

Preventivni fungicid s sistemskim delovanjem za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*). S kombinacijo dveh aktivnih snovi zagotavlja zanesljivo zaščito listov in celotne novoizrasle listne mase ter krepi naravno odpornost rastline.

PAKIRANJE: 1 L

PRIPOROČILO ZA UPORABO: 3,2 L/ha

**Enervin®**  
**Pro**

# Sercadis®

**BASF**  
We create chemistry

Preventivni in kurativni fungicid, ki se uporablja na gomoljih krompirja za delno zmanjševanje okužb z belo nogo krompirja (*Rhizoctonia solani*).

**PAKIRANJE: 1 L**

**PRIPOROČILO ZA UPORABO:**

- tik pred sajenjem v zaprtih prostorih oziroma na prostem v odmerku 20 mL/100 kg krompirja
- v času sajenja na prostem v odmerku 0,8 L/ha

# Sercadis® Plus

**BASF**  
We create chemistry

Fungicid, ki v krompirju učinkovito zmanjšuje okužbe črne listne pegavosti (*Alternaria solani*) in alternarijske pegavosti (*Alternaria alternata*). Ker deluje preventivno, je ključnega pomena, da je rastlina zaščitena še pred razvojem prvih opaznih simptomov bolezni.

**PAKIRANJE: 1 L**

**PRIPOROČILO ZA UPORABO: 0,75 L/ha**

## FUNGICIDI

Fungicidno zaščito krompirja je potrebno obnavljati na 10 – 14 dni. **Naši agronomi priporočajo uporabo različnih aktivnih snovi, da bi preprečili rezistenco!**



## COPFORCE EXTRA

Prvo škropljenje se priporoča na osnovi bakra s COPFORCE EXTRA, edinstvenim kontaktnim fungicidom, ki deluje na rastlino preventivno ali ko je okužba že prisotna. Vsebnost bakrovega hidroksida preprečuje kalitev spor z zaviranjem encimov, ki sodelujejo pri procesu dihanja, cimoksanil pa za hiter prodor v list.

**PAKIRANJE: 100 g, 250 g, 1 kg, 10 kg**

**PAKIRANJE IN PRIPOROČILO ZA UPORABO:**  
100 g/50 L vode; 250 g/125 L vode; 2 kg/ha

## NORIOS

Po prvem tretiranju je potrebno zagotoviti zaščito pred črno listno pegavostjo. S sistemskim fungicidom **NORIOS**, ki z aktivno snovjo azoksistrobin deluje na širok spekter bolezni. Deluje na način, da zavira dihanje in kalitev spor ter preprečuje rast novega micelija pri črni listni pegavosti (*Alternaria solani*). \*Tretiranje za zaščito pred rjavo koreninsko gnilobo (*Colletotrichum coccodes*) se opravi ob sajenju krompirja v brazde v odmerku 3 L/ha.

**PAKIRANJE: 25 mL, 100 mL, 1 L**

**PRIPOROČILO ZA UPORABO: 25 mL/25 L vode;**  
100 mL/100 L vode; 1 L/ha

## RIVAL DUO

RIVAL DUO omogoča učinkovito dopolnjevanje dveh aktivnih snovi (cimoksanil in propamokarb hidroklorid) ter se uporablja za škropljenje ob že prisotni okužbi.

**PAKIRANJE: 100 mL, 250 mL, 1 L**

**PRIPOROČILO ZA UPORABO: 100 mL/40 L vode;**  
250 mL/100 L vode; 2,5 L/ha

Da bi naš krompir ostal zdrav do pobiranja, se po tretiranju z RIVAL DUO priporoča uporaba pripravka INFINITO.





# INFINITO

Sistemični fungicid z neprekosljivim preventivnim in delno kurativnim delovanjem za zatiranje krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*).

**PAKIRANJE IN PRIPOROČILO ZA UPORABO:**  
250 mL za 0,2 ha

## KOLORADSKI HROŠČ

### ACETOGAL **NOVO**

Sistemični insekticid iz skupine neonikotinoidov deluje na koloradskega hrošča (*Leptinotarsa decemlineata*) in listne uši tako, da onemogoča njihovo delovanje, kar povzroči izgubo orientacije, prenehanje hranjenja in smrt.

\*S sredstvom se tretira ob razvoju prvega in drugega stadija ličink v jutranjem času, ker so ličinke takrat najbolj aktivne pri hranjenju.

**PAKIRANJE:** 10 g, 40 g, 100 g, 500 g, 1 kg  
**PRIPOROČILO ZA UPORABO:** 10 g/25 L vode;  
40 g/100 L vode; 125 g/ha



### SHENZI 200 SC **NOVO**

Nova MOČ v borbi proti koloradskemu hrošču (*Leptinotarsa decemlineata*) je SHENZI 200 SC. Po priporočilu naših agronomov za drugo tretiranje proti koloradskemu hrošču, da se izognete rezistenci, uporabite kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem SHENZI.

Uporabite ga v odmerku 60 mL/ha.

## KAJ POTREBUJE KROMPIR ZA BOLJŠO RAST IN KAKOVOSTNEJŠI PRIDELEK?

### Na začetku sezone:

### FITOFERT BIOFLEX-L

Foliarno gnojilo na osnovi ALG, ki se mora uporabljati na začetku vegetacije in v času oblikovanja plodov. Gnojilo aktivira proizvodnjo rastlinskih hormonov, kar vpliva na donos, kakovost, velikost plodov in prenos hranil po rastlini.

**PAKIRANJE:** 250 mL, 1 L, 5 L, 10 L  
**PRIPOROČILO ZA UPORABO:** 250 mL/100 L vode; 2–3 L/ha

### Med sezono:

### FITOFERT KRISTAL UNIFORM (Vodotopno gnojilo za zelenjavo)

Dodajanje univerzalnega gnojila za zelenjadnice, ki z osnovnimi elementi poskrbi za celotno prehrano krompirja tekom sezone z zalivanjem ali s foliarnim dognojevanjem.

**PAKIRANJE:** 1 kg  
**PRIPOROČILO ZA UPORABO:** 500 g/100 L vode

### Med sezono in pred koncem sezone:

### FITOFERT MAGNICAL-B

Dodajanje KALCIJA krompirju je zelo pomembno, saj z njim vplivamo na izboljšanje kakovosti gomoljev, boljše skladiščenje in odpornost na udarce. Krompir je tako manj občutljiv na stres. Pomembno je dodajanje v času začetka tvorbe gomoljev.

**PAKIRANJE:** 250 mL, 1 L, 5 L  
**PRIPOROČILO ZA UPORABO:** 250 mL/100 L vode; 2 – 3 L/ha



**DUŠAN OZVATIČ**

Vodja strateške prodaje  
T: 031 804 975  
E: [dusan.ozvatic@semenarna.si](mailto:dusan.ozvatic@semenarna.si)

**ANITA HORVAT**

Vodja veleprodaje  
E: [anita.horvat@semenarna.si](mailto:anita.horvat@semenarna.si)

**KLARA JABLANOVEC**

Skrbnik področja FFS  
E: [klara.jablanovec@semenarna.si](mailto:klara.jablanovec@semenarna.si)

**STANISLAV HAJDINJAK**

Trgovski zastopnik  
Regija: Pomurska, Koroška  
T: 031 848 965  
E: [stanislav.hajdinjak@semenarna.si](mailto:stanislav.hajdinjak@semenarna.si)

**MONIKA CVETKO**

Promotor  
Regija: Podravska, del Pomurske  
T: 040 353 910  
E: [monika.cvetko@semenarna.si](mailto:monika.cvetko@semenarna.si)

**DARKO KOŠAR**

Trgovski zastopnik  
Regija: Podravska, del Pomurske  
T: 040 205 830  
E: [darko.kosar@semenarna.si](mailto:darko.kosar@semenarna.si)

**JERNEJA ERMAN JANČAR**

Trgovski zastopnik  
Regija: del Osrednjeslovenske, Dolenjska,  
del Gorenjske  
T: 030 640 154  
E: [jerneja.erman@semenarna.si](mailto:jerneja.erman@semenarna.si)

**SIMONA TERŠEK**

Trgovski zastopnik  
Regija: Savinjska, Zasavska, Posavska in del  
Osrednjeslovenske  
T: 041 656 471  
E: [simona.tersek@semenarna.si](mailto:simona.tersek@semenarna.si)

**MATEJA PERKOVIČ**

Asistent v sektorju trženja  
Regija: Podravska, Pomurska, Koroška  
T: 030 705 009  
E: [mateja.perkovic@semenarna.si](mailto:mateja.perkovic@semenarna.si)

**FRANKO ŠIK**

Trgovski zastopnik  
Regija: Goriška, Obalno-Kraška,  
Notranjsko-Kraška  
T: 040 853 301  
E: [franko.sik@semenarna.si](mailto:franko.sik@semenarna.si)

**VALENTINA VUČAK**

Asistent v sektorju trženja  
Regija: Savinjska, Zasavska, Posavska,  
Osrednjeslovenska, Dolenjska, Gorenjska,  
Goriška, Obalno-Kraška, Notranjsko-Kraška  
T: 040 453 593  
E: [valentina.vucak@semenarna.si](mailto:valentina.vucak@semenarna.si)

Za več informacij pokličite naše strokovne svetovalce,  
obiščite našo spletno stran [www.semenarna.si](http://www.semenarna.si)  
ali nam pišite na [info@semenarna.si](mailto:info@semenarna.si).

Vse novice lahko spremljate tudi na portalih:



# EMBALAŽE SEMENSKEGA KROMPIRJA

Semski krompir je na voljo v različnih pakiranjih. 25- kilogramske vreče so primerne za površino ca. 100 m<sup>2</sup>, za manjše površine pa je krompir v embalažah po 10 kg, 5 kg in 3 kg.





# SEMENSKI KROMPIR

Veleprodajni katalog semenskega  
krompirja za leto 2026

agronasvet  

Semenarna Ljubljana 



Semenarna Ljubljana, d.o.o.  
Bratislavška cesta 5  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 475 92 00  
faks: 01 427 35 38  
e-pošta: info@semenarna.si  
www.semenarna.si